

LACTAS

LACTASA 9000 U (USP)

Comprimidos ranurados

Industria Argentina - Venta bajo receta

FÓRMULA. Cada comprimido ranurado contiene:
Principio activo: Lactasa 9000 U.(USP).
Excipientes: Manitol; Citrato de sodio; Estearato de magnesio vegetal; Croscarmelosa sódica; Celulosa microcristalina; Sacarina sódica 2.9 mg; Esencia artificial de vainilla; Fosfato dipotásico; Edetato disódico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Suplemento digestivo.

INDICACIONES
Intolerancia a la lactosa manifestada por malestares gastrointestinales como dolor abdominal, calambres, hinchazón, flatulencia y/o diarrea, después de la ingestión de productos lácteos o de otros productos que contienen lactosa.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La enzima lactasa (β-galactosidasa), hidroliza el disacárido lactosa en dos azúcares simples, glucosa y galactosa, que se absorben rápidamente y son digeribles.

POSOLOGÍA - MODO DE ADMINISTRACIÓN
El grado de insuficiencia lactásica varía entre individuos y la cantidad de lactosa varía en los distintos alimentos, por lo que cada paciente deberá aumentar o disminuir la cantidad de **LACTAS** que se aconseja utilizar, de acuerdo a sus necesidades, hasta lograr su bienestar.

LACTAS comprimidos se administra por vía oral para producir la hidrólisis de la lactosa "in vivo", o sea provee la enzima que ayuda a la digestión de los alimentos lácteos.

Modo de administración: Los comprimidos pueden tragarse o masticarse y pueden ser usados inmediatamente antes o durante la ingestión de leche o cualquier alimento lácteo o que contiene lactosa. Como **LACTAS** actúa solamente sobre el alimento cuando se ingiere, se deberá usar cada vez que se lo consuma. Se recomienda tragar o masticar 1 comprimido con la primera porción de alimento lácteo o que contenga lactosa, ingerido. No utilice más de 2 comprimidos por vez.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Embarazo. Lactancia. Niños menores de 12 años, sin supervisión médica.

ADVERTENCIAS
Debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes de urticaria, asma bronquial, hipersensibilidad a otras drogas o alergias alimenticias.

Ante cualquier síntoma inusual o que parezca no relacionado con la condición por la cual se utiliza este producto, consultar al médico antes de repetir la administración del mismo.
En caso de diabetes debe tenerse presente que el uso de este medicamento hace que la lactosa esté metabólicamente disponible como glucosa y galactosa.
En caso de presentarse algún efecto adverso, disminuir la dosis o interrumpir la administración del medicamento.
Como el grado de deficiencia enzimática varía de persona a persona y de un alimento a otro, puede ocurrir que al principio **LACTAS** no produzca el efecto deseado. En este caso deberá ajustarse el número de comprimidos a administrar hacia arriba o hacia abajo de la dosis recomendada hasta lograr el bienestar buscado. No ingerir más de 2 comprimidos por vez.

PRECAUCIONES
Embarazo - Lactancia: no se han documentado problemas debidos al uso de este medicamento en pacientes embarazadas ni mientras están amamantando. No se sabe si la lactasa pasa a la leche materna.
Pediatría: no se han realizado estudios en la población pediátrica. No se aconseja su administración a menores de 12 años sin supervisión médica.
Geriatría: no se han realizado estudios ni se han documentado problemas que relacionen la edad con los efectos de este medicamento.

EFFECTOS ADVERSOS
Hipersensibilidad: en raras ocasiones puede producirse erupción. Gastrointestinales: aunque no es frecuente, puede producirse constipación, sensación de plenitud abdominal, vómitos.

SOBREDOSIFICACIÓN
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:(011) 4962-6666 / 2247 Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 comprimidos ranurados, los 3 últimos para uso exclusivo de hospitales.

Conservar a no más de 30° C, en su envase original. No refrigerar. Proteger del calor y la humedad.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado n.° 49.996.

Directora Técnica: Sandra Carina Rismondo, Farmacéutica.

Fecha de última revisión: agosto de 2007.

2185-1

D LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

Avda. La Plata 2552, (1437) Buenos Aires