

PREPARACION PARA EL ESTUDIO RADIOLOGICO – ENDOSCOPICO
DE COLON Y CIRUGIA DE COLON CON **BAREX KIT**

ESTUDIOS A REALIZAR POR LA TARDE

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado de su estudio, está condicionado al estricto cumplimiento de las instrucciones que se detallan a continuación:

Para este estudio usted necesitará comprar un envase de **BAREX KIT**

DIA PREVIO AL EXAMEN

Prepare BAREX contenido en el kit (2 frascos con polvo para reconstituir 1 litro de solución cada uno) de acuerdo a las instrucciones del envase original y colóquelo en la heladera.

Evitar frutas, verduras y lácteos. Tomar abundantes líquidos claros no gasificados (agua mineral, jugo tipo gatorade de pomelo, caldos colados, jugos colados, mate o té)

12 hs. Almuerzo: carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas.

20 hs. Cena: Caldo con arroz o fideos. Gelatina de frutas. Esta es la última comida sólida antes del examen.

21 hs. Tomar los cuatro comprimidos de **Bisacodilo Dominguez** con un vaso con agua sin masticarlos. Después de tomar los comprimidos de **Bisacodilo Dominguez**, puede tomar la cantidad de líquidos claros no gasificados que desee (agua mineral, jugo tipo gatorade de pomelo, caldos colados, jugos colados, mate, té)

DIA DEL EXAMEN

7 hs. Te o líquidos claros no gasificados.

8 hs. Comience a tomar **BAREX**, tomando un vaso grande (aproximadamente 200 cc) cada 15 minutos hasta completar la totalidad de la solución reconstituida (2 litros). La tolerancia es mejor tomando el vaso completo y bien frío rápidamente en lugar de tomarlo de a pequeñas cantidades.

Recuerde que durante las tres horas previas a su examen no deberá ingerir nada por boca

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

Para esta preparación debe tenerse en cuenta que, si usted padece de diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, está embarazada o cree estarlo, debe consultar previamente con su médico.

ADVERTENCIA

Durante la preparación colónica se perderán grandes cantidades de líquido, esto es normal. Se recomienda entonces, tomar abundante cantidad de líquidos claros para prevenir una deshidratación y asegurar que el intestino esté bien limpio al momento de la realización del estudio