

LACTAS

Lactasa 4500 U (USP)

Cápsulas

Industria Argentina
Venta bajo receta

FÓRMULA

Cada cápsula contiene:

Principio activo: Lactasa 4500 U.

Excipientes: Celulosa microcristalina; Estearato de magnesio vegetal; Fosfato dipotásico; Edetato disódico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento digestivo.

INDICACIONES

Intolerancia a la lactosa manifestada por malestares gastrointestinales como dolor abdominal, calambres, hinchazón, flatulencia y/o diarrea, después de la ingestión de productos lácteos o de otros productos que contienen lactosa.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

La enzima lactasa (β -galactosidasa), hidroliza el disacárido lactosa en dos azúcares simples, glucosa y galactosa, que se absorben rápidamente y son digeribles.

POSOLÓGIA - MODO DE ADMINISTRACIÓN

El grado de insuficiencia lactásica varía entre individuos y la cantidad de lactosa varía en los distintos alimentos, por lo que cada paciente deberá aumentar o disminuir la cantidad de **LACTAS** que se aconseja utilizar, de acuerdo a sus necesidades. **LACTAS** cápsulas se administra por vía oral para producir la hidrólisis de la lactosa "in vivo", o sea provee la enzima que ayuda a la digestión de los alimentos lácteos.

Modo de administración: Las cápsulas pueden ser usadas inmediatamente antes o durante la ingestión de leche o cualquier alimento lácteo o de otros productos que contienen lactosa. Como **LACTAS** actúa solamente sobre el alimento cuando se ingiere, se deberá usar cada vez que se lo consuma.

Se recomienda tomar 1-2 cápsulas con la primera porción ingerida de alimento lácteo o que contenga lactosa.

No utilice más de 4 cápsulas por vez.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Embarazo. Lactancia. Niños.

ADVERTENCIAS

Debe administrarse con precaución a ancianos y a pacientes con antecedentes de urticaria, asma bronquial, hipersensibilidad a otras drogas o alergias alimenticias.

Ante cualquier síntoma inusual o que parezca no

relacionado con la condición por la cual se utiliza este producto, consultar al médico antes de repetir la administración del mismo.

En caso de diabetes debe tenerse presente que el uso de este medicamento hace que la lactosa esté metabólicamente disponible como glucosa y galactosa.

En caso de presentarse algún efecto adverso, disminuir la dosis o interrumpir la administración del medicamento.

Como el grado de deficiencia enzimática varía de persona a persona y de un alimento a otro, puede ocurrir que al principio **LACTAS** no produzca el efecto deseado. En este caso deberá ajustarse el número de cápsulas a administrar hacia arriba o hacia abajo de la dosis recomendada hasta lograr el bienestar buscado. No ingerir más de 4 cápsulas por vez.

PRECAUCIONES

Embarazo - Lactancia: No se han documentado problemas debidos al uso de este medicamento en pacientes embarazadas ni mientras están amamantando. No se sabe si la lactasa pasa a la leche materna.

Pediatría

No se han realizado estudios con cápsulas en la población pediátrica.

Geriatría

No se han realizado estudios ni se han documentado problemas que relacionen la edad con los efectos de este medicamento.

EFFECTOS ADVERSOS

Hipersensibilidad: en raras ocasiones puede producirse erupción.

Gastrointestinales: Aunque no es frecuente, puede producirse constipación, sensación de plenitud abdominal, vómitos.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 10, 20 y 50 cápsulas.

Conservar a no más de 30°C, en su envase original.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 49.996.

Directora Técnica: Farm. Sandra Carina Rismondo

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

Av. La Plata 2552, (1437) C.A.B.A., Argentina.

Fecha de última revisión: Julio 2005



D

DOMINGUEZ