

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION PARA COLONOSCOPIA CON NOVOPREP

(Adultos y niños de 9 años o más)

Estudios que se realizan entre las 12:00 y las 15:30 hs

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES

El objetivo de esta preparación es lograr una adecuada limpieza del colon y para realizarla se requiere de su colaboración en relación al **estricto cumplimiento de las indicaciones**. Debe saber que la persistencia de restos fecales en el colon, impiden que el médico pueda explorar adecuadamente el intestino, siendo en algunos casos, necesario la repetición del estudio.

Una preparación completa requiere que tome los **2 sobres** de este medicamento reconstituidos en agua potable fría inmediatamente antes de cada administración y tomados separadamente de acuerdo al esquema que le indicó su médico.

ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN:

Se recomienda seguir una dieta a base de líquidos claros el día en que se realizará el estudio. Usted deberá permanecer en ayunas desde por lo menos 2 horas antes de la administración del primer sobre de NOVOPREP.

Después de cada dosis, se deben consumir líquidos claros* adicionales (NO SOLO AGUA).

* **Líquidos claros:** agua, jugos claros sin pulpa, bebidas en polvo, bebidas deportivas, bebidas gaseosas que no sean rojas o de color púrpura, jugo de manzana, café o té (edulcorados, pero sin leche, crema, soja o cremas no lácteas), caldos claros o consomé. NO beba líquidos a través de los cuales no pueda ver. NO beba bebidas alcohólicas. NO tome ningún líquido rojo o púrpura.

No consumir ningún alimento sólido ni leche.

DIA PREVIO AL ESTUDIO

El día anterior al estudio se recomienda ingerir una dieta baja en residuos.

PRIMERA DOSIS: Aproximadamente Entre las 17:00 y 21:00 hs.	• Reconstituir el polvo justo antes de tomar las dosis, no reconstituir con anterioridad. • Colocar en un vaso aproximadamente (aprox. 150 - 200 ml), de agua potable fría y verter allí lentamente el contenido de un sobre de NOVOPREP (primera dosis). • Mezclar bien cuidadosamente durante 3 minutos hasta que se haya reconstituido todo el polvo. Para lograr una mejor reconstitución, dejar reposar durante aproximadamente 5 minutos y agitar bien nuevamente la preparación antes de beber. La preparación puede calentarse ligeramente cuando se agrega el polvo. Se recomienda dejar enfriar el líquido antes de ingerirlo. Una vez que el polvo esté completamente disuelto bébala inmediatamente. • Tomar a continuación al menos 5 vasos de aproximadamente 220 mL de líquidos claros* (no solo agua). • Seguir consumiendo líquidos claros* (no solo agua) dentro de las 5 horas siguientes
---	---

DIA DEL ESTUDIO

SEGUNDA DOSIS: Aproximadamente 5 horas antes del estudio	• Reconstituir el polvo justo antes de tomar las dosis, no reconstituir con anterioridad. • Colocar en un vaso aproximadamente (aprox. 150 - 200 ml), de agua potable fría y verter allí lentamente el contenido de un sobre de NOVOPREP (segunda dosis). • Mezclar bien cuidadosamente durante 3 minutos hasta que se haya reconstituido todo el polvo. Para lograr una mejor reconstitución, dejar reposar durante aproximadamente 5 minutos y agitar bien nuevamente la preparación antes de beber. La preparación puede calentarse ligeramente cuando se agrega el polvo. Se recomienda dejar enfriar el líquido antes de ingerirlo. Una vez que el polvo esté completamente disuelto bébala inmediatamente. • Tomar a continuación al menos 3 vasos de aproximadamente 220 mL de líquidos claros* (no solo agua). • Seguir consumiendo líquidos claros* (no solo agua) hasta 2 horas antes del estudio.
---	---

Durante el régimen de administración, se deben consumir líquidos claros* adicionales (**no solo agua**) antes, durante y después de cada dosis. Debe beberlos hasta 2 horas antes de realizar el estudio.

Es muy importante para usted tomar la cantidad de líquidos claros* indicada para prevenir la pérdida de líquidos (deshidratación).

MUY IMPORTANTE:

- Si experimenta hinchazón severa, distensión o dolor abdominal luego de haber consumido el primer sobre de este producto, demore la administración del segundo sobre hasta que los síntomas se hayan resuelto (hayan desaparecido). Si estos síntomas se agravan, consulte inmediatamente a su médico

Recurra inmediatamente a un profesional médico en los siguientes casos:

- Si desarrolla signos y síntomas de deshidratación, como boca pegajosa o reseca, somnolencia, ausencia o disminución de la orina, orina color amarillo oscuro, presión arterial baja, mareos, aumento de la frecuencia cardíaca o palpitaciones, o vómitos que le impidan ingerir las cantidades adicionales prescritas de líquidos claros* que usted debe tomar después de haber ingerido el primer sobre del medicamento
- Si después de haber tomado el primer sobre de NOVOPREP observa urticaria (ronchas) o erupción. Estos pueden ser signos de reacción alérgica.