

LACTAS LACTASA

Gotas

Industria Argentina
Venta bajo receta

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Principio activo: Lactasa 500.000 U.
Excipientes: glicerina; butilhidroxianisol; propilenglicol; simeticona; metilparabeno sódico; propilparabeno sódico; agua destilada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento digestivo.

INDICACIONES

Intolerancia a la lactosa manifestada por malestares gastrointestinales como dolor abdominal, calambres, hinchazón, flatulencia y/o diarrea, después de la ingestión de productos lácteos o de otros productos que contienen lactosa.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

La enzima lactasa (β -galactosidasa), hidroliza el disacárido lactosa en dos azúcares simples, glucosa y galactosa, que se absorben rápidamente y son digeribles.

PRECAUCIONES

Embarazo - Lactancia

No se han documentado problemas debidos al uso de este medicamento en pacientes embarazadas ni mientras están amamantando. No se sabe si la lactasa pasa a la leche materna.

Pediatría

No se han realizado estudios ni se han documentado problemas que relacionen la edad con los efectos de este medicamento. Se debe prestar especial atención a las reacciones alérgicas cuando se administra a bebés prematuros o recién nacidos porque tienen aumentada la permeabilidad intestinal.

No se aconseja su administración a menores de 12 años sin supervisión médica.

Geriatría

No se han realizado estudios ni se han documentado problemas que relacionen la edad con los efectos de este medicamento.

EFECTOS ADVERSOS

Hipersensibilidad: en raras ocasiones puede producirse erupción.

Gastrointestinales: aunque no es frecuente, puede producirse constipación, sensación de plenitud abdominal, vómitos.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

El grado de insuficiencia lactásica varía entre individuos y la cantidad de lactosa varía en los distintos alimentos, por lo que cada paciente deberá aumentar o disminuir la cantidad de **LACTAS** que se aconseja utilizar, de acuerdo a sus necesidades, hasta lograr su bienestar.

LACTAS gotas, se agrega a la leche para producir la hidrólisis de la lactosa "in vitro".

Modo de uso: agregar las gotas de **LACTAS** a 1 litro de leche; mezclar suavemente y mantenerla en heladera durante 24 hs.

Se aconseja comenzar con 5-7 gotas por litro de leche. Si después de consumir la leche todavía experimenta malestar, puede agregar 10 o hasta 15 gotas de **LACTAS** por litro de leche; 15 gotas por litro removerá toda la lactosa de la leche. **LACTAS** puede usarse con cualquier tipo de leche o leche chocolatada.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad.

ADVERTENCIAS

Debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes de urticaria, asma bronquial, hipersensibilidad a otras drogas o alergias alimenticias. Ante cualquier síntoma inusual o que parezca no relacionado con la condición por la cual se utiliza este producto, consultar al médico antes de repetir la administración del mismo. En caso de diabetes debe tenerse presente que el uso de este medicamento hace que la lactosa esté metabólicamente disponible como glucosa y galactosa.

En caso de presentarse algún efecto adverso, disminuir la dosis o interrumpir la administración del medicamento.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 // 658-7777.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 3,5 y 7 mL.

CONSERVAR entre 15 y 30 °C.

Una vez abierto el frasco de las gotas, conservarlo en la heladera.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado n.º 49.996.

Directora Técnica:

Sandra Carina Rismondo, Farmacéutica.

Fecha de última revisión: noviembre 2001.

2056-3



**LABORATORIO
DOMINGUEZ S.A.**

Avda. La Plata 2552, (1437) Buenos Aires