

**PREPARACION PARA EL ESTUDIO RADIOLOGICO – ENDOSCOPICO  
DE COLON Y CIRUGIA DE COLON CON **BAREX KIT****

**ESTUDIOS A REALIZAR POR LA TARDE**

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado de su estudio, está condicionado al estricto cumplimiento de las instrucciones que se detallan a continuación:

Para este estudio usted necesitará comprar un envase de **BAREX KIT**

**DIA PREVIO AL EXAMEN**

**Prepare BAREX contenido en el kit (2 frascos con polvo para reconstituir 1 litro de solución cada uno) de acuerdo a las instrucciones del envase original y colóquelo en la heladera.**

Evitar frutas, verduras y lácteos. Tomar abundantes líquidos claros no gasificados (agua mineral, jugo tipo gatorade de pomelo, caldos colados, jugos colados, mate o té)

**12 hs. Almuerzo:** carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas.

**20 hs. Cena:** Caldo con arroz o fideos. Gelatina de frutas. Esta es la última comida sólida antes del examen.

**21 hs.** Tomar los cuatro comprimidos de **Bisacodilo Dominguez** con un vaso con agua sin masticarlos. Después de tomar los comprimidos de **Bisacodilo Dominguez**, puede tomar la cantidad de líquidos claros no gasificados que desee (agua mineral, jugo tipo gatorade de pomelo, caldos colados, jugos colados, mate, té)

**DIA DEL EXAMEN**

**7 hs.** Te o líquidos claros no gasificados.

**8 hs.** Comience a tomar **BAREX**, tomando un vaso grande (aproximadamente 200 cc) cada 15 minutos hasta completar la totalidad de la solución reconstituida (2 litros). La tolerancia es mejor tomando el vaso completo y bien frío rápidamente en lugar de tomarlo de a pequeñas cantidades.

**Recuerde que durante las tres horas previas a su examen no deberá ingerir nada por boca**

**LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.**

**Para esta preparación debe tenerse en cuenta que, si usted padece de diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, está embarazada o cree estarlo, debe consultar previamente con su médico.**

**ADVERTENCIA**

**Durante la preparación colónica se perderán grandes cantidades de líquido, esto es normal. Se recomienda entonces, tomar abundante cantidad de líquidos claros para prevenir una deshidratación y asegurar que el intestino esté bien limpio al momento de la realización del estudio**