

PREPARACION PARA COLONOSCOPIA CON SULFODOM

Estudio de colon a realizarse por la mañana

Sin estos requisitos no se podrá efectuar su estudio:

- Como el procedimiento se realiza con anestesia, debe asistir acompañado por un adulto responsable y no podrá conducir vehículos durante las 12 horas posteriores a la realización del examen.
- Traer estudios anteriores

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Para esta preparación necesitará: 1 SULFODOM

Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, insulina o tiene insuficiencia renal o padece de problemas cardíacos, debe consultar previamente a su médico de cabecera.

Esta preparación está diseñada para lograr una adecuada limpieza del colon. Para realizarla se requiere de su indispensable colaboración. La persistencia de restos fecales en el colon, impide que el médico endoscopista pueda explorar adecuadamente el intestino. En algunos casos, incluso, puede ser necesario repetir el estudio por esta causa.

3 DIAS PREVIOS AL ESTUDIO

Suprimir frutas, verduras crudas, semillas y cereales. Consumir carnes rojas o blancas, arroz y/o fideos. Beber abundantes líquidos no gasificados.

DIA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO

Sólo se podrá tomar un desayuno ligero o líquidos claros. No comer nada a la hora de la cena.

- NO tomar leche
 - NO comer ni tomar nada de color rojo o violeta
 - NO tomar bebidas alcohólicas
 - NO use ningún tipo de crema, ni láctea ni artificial
- **Líquidos claros:** Agua potable, jugos de frutas colados (sin pulpa) como de manzana, naranja, uva blanca, limonada, café o té caldo de pollo, postre de gelatina (que no sea roja ni violeta) sin agregado de fruta ni crema.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

La dosis para una completa limpieza colónica requiere la toma del contenido de ambos frascos. Idealmente en dosis divididas. Cada frasco contiene 177 ml de solución concentrada que debe ser diluido con agua potable hasta la línea de llenado marcada en el vaso (480 ml).

NO USAR LA SOLUCION DEL FRASCO SIN DILUIR

DIA DEL PROCEDIMIENTO

1. La tarde anterior al procedimiento – 18 horas (1er frasco)

- Colocar el contenido de UN frasco dentro del vaso suministrado
- Agregar agua potable hasta la línea de llenado marcada en el vaso (480 ml) Mezclar
- Beber **TODO** el líquido del vaso
- Durante la hora siguiente se debe tomar 1 litro más de agua potable

2. En la mañana del procedimiento – 4 AM (2do frasco)

- Tome solamente líquidos claros hasta después del estudio. Evitar los líquidos de color rojo o violeta, leche y bebidas alcohólicas.
- Colocar el contenido del segundo frasco dentro del vaso suministrado
- Agregar agua potable hasta la línea de llenado marcada en el vaso (480 ml). Mezclar. Tomar durante 60 a 90 minutos.
- Beber **TODO** el líquido del vaso
- Durante la hora siguiente se debe tomar 1 litro más de agua potable.

AYUNO TOTAL A PARTIR DE LAS 6:00 HORAS

INSTRUCCIONES ADICIONALES

No es necesario suspender ningún tipo de medicación a excepción de los suplementos de hierro por boca, los cuales necesitan ser interrumpidos 3 días antes del estudio.

Si usted está anti coagulado o toma algún antiagregante plaquetario, debe traer, por escrito, la indicación de su médico clínico, hematólogo o cardiólogo en donde explique la conducta a seguir con estos medicamentos: cuándo suspender, reanudar y si usted se encuentra apto para la realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos.

Este requisito es indispensable.

R/P:

1 SULFODOM

.....
FIRMA Y SELLO DEL MEDICO